

Übersicht 1: Anwendungshinweise und Wirkungsspektrum der wichtigsten Rapsherbizide

Präparate	Preis in EUR pro ha	Abstand zu Gewässern		Abstand zu Saumbiotopen		Wirkstoff g/l o. kg	Aufwand/ha kg bzw. l	Termin	Ausfall- getreide	A.fuchs- schwanz	Trespen	Quecke	Kletten- labkraut	Kamille	Vogel- miere	Taub- nessel	Stiefmüt- terchen	Hirten- täschel	Rauken
Butisan (N, Xn)	57	5 m	75%	-		Metazachlor 500	1,5	NAK ²⁾	+	+++	-	-	++	+++	+++	+++	+	+(+)	+(+)
Butisan Top (N, Xi)	88	⁶⁾	90%	-		Metazachlor + Quinmerac 375 + 125	2	NAK ²⁾	+	+++	-	-	+++	+++	+++	+++	+	+(+)	+(+)
Brasan (N, Xn)	68-102	⁶⁾	90%	5 m	90%	Dimethachlor + Clomazone 500 + 40	2,0 - 3,0	VA	-	+++ ³⁾	-	-	+++	++(+)	+++	+++	+	+++	+++
Cirrus (F)	51	10 m		5 m	90%	Clomazone 500	0,24	VA	-	-	-	-	+++	(+)	+++	+++	-	+++	+++
Devrinol Kombi CS	67-84	20 m		-		Trifluralin+ Napropamid 240 + 190	4,0 - 5,0	VSE	+	++	-	-	++	+++	+++	+++	+	+	+
Devrinol FL	64	10 m		-		Napropamid 450	2,5	VSE	+	++	-	-	+	+++	+++	+	-	+	+
Effigo	?	⁶⁾		-		Clopyralid + Picloram 267 + 67	0,35	NAH/NAF	-	-	-	-	++(+)	+++	-	-	-	-	-
Lontrel 100	74	⁶⁾		0 m	50%	Clopyralid 100	1,2	NAF	-	-	-	-	-	+++ ⁵⁾	-	-	-	-	-
Nimbus CS (N, Xi)	85-102	⁶⁾	90%	5 m	90%	Metazachlor + Clomazone 250 + 33,3	2,5-3,0	VA	+	+++	-	-	+++	+++	+++	+++	+	+++	++(+)
Pradone Kombi *)		10 m		-		Carbetamid + Dimefuron 500 + 250	3,5 kg	NA	+++	+++	-	-	+++	++	+++	+++	++	+(+)	+(+)
Treflan, Triflurex (N,Xn) 1)	19-24	20 m		-		Trifluralin 480	2,0 - 2,5	VSE	+	++	-	-	+++	+	+++	++	+	+	+
Agil S (N, Xn)	22-30	10 m		0 m	50%	Propaquizafop 100	0,75 - 1,0 ⁸⁾	NAH/NAF	+++	+++	+++ ⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Focus Ultra (Xn)	26-35	⁶⁾		0 m	90%	Cycloxydim 100	1,5 – 2,0 ⁸⁾	NAH/NAF	+++	+++	+++ ⁹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Fusilade Max (N Xn) ¹⁾	21-27	6)		-		Fluazifop-P-butyl 125	0,8 - 1,0 ⁸⁾	NAH/NAF	+++	+++	+++ ⁹⁾	2	-	-	-	-	-	-	-
Gallant Super (N, Xn)	20-25	6)		-		Haloxyfop-R 104	0,4 - 0,5 ⁸⁾	NAH	+++	+++	+++ ⁹⁾	1	-	-	-	-	-	-	-
Kerb 50 W (Xn)	35-46	6)		5 m	90%	Propyzamid 500	0,75 - 1,0 ⁸⁾	NAH ⁷⁾	+++	+++	+++	-	-	++	-	-	-	-	-
Select 240 EC (Xi) + Para-Sommer	28	5 m	90%	-		Clethodim + Mineralöle 241,9 + 654	0,5 + 1,0 ⁸⁾	NAH	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-
Targa Super (Xi)	20-34	6)		0 m	50%	Quizalofop-P 46,3	0,75-1,25 ⁸⁾	NAH	+++	+++	+++ ⁹⁾	2	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ = auch für Sommerapps; ²⁾ = Keimblatt der Unkräuter; ³⁾ = bei 2,0 l/ha nicht ausreichend; ⁴⁾ = nur gegen kleine Entwicklungsstadien; ⁵⁾ = bis 4-Blattstadium 0,8 l/ha; ⁶⁾ = Abstand nach Landesrecht; ⁷⁾ = Vegetationsruhe;

⁸⁾ = niedrige Aufwandmenge nur gegen Wintergerste; ⁹⁾ = höhere Aufwandmengen wählen

*) = Aufbrauchfrist bis 31.12.2006.